

# Så använder du AeroBec<sup>®</sup> Inhalationspray



Till dig som ordinerats detta läkemedel.

## Varför AeroBec Inhalationsspray?

Det här läkemedlet har ordinerats av din läkare, för att behandla din astma.

Det är viktigt att du följer de instruktioner och den dos som din läkare ordinerat även om du känner dig bättre. Hör av dig till din läkare eller sjuksköterska om du har frågor. Läs bipacksedeln i förpackningen eller på [www.fass.se](http://www.fass.se).

## Rengör din inhalationsspray

Munstycket torkas på utsidan med en ren och torr trasa eller servett. Varken behållaren eller plastmunstycket får komma i kontakt med vatten.

## Hur vet jag när AeroBec Inhalationsspray är tom?


När du inte kan känna någon vätska när du skakar den lätt, eller om det inte kommer någon puff när du testar att trycka av en dos i luften, då är den tom.

## Skötselråd

- Använd före utgångsdatumet på förpackningen.
- Förvaras vid högst 30°C.
- Undvik hög värme som direkt solljus.
- Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

# Så här använder du AeroBec Inhalationsspray

1



Ta av locket.

2

Andas ut  
varsamt, slut  
sedan läpparna  
tätt kring munstycket  
och andas in sakta men  
kraftfullt samtidigt som  
du trycker ner metallflaskan  
på inhalationssprayens  
ovansida. Håll andan i  
10 sekunder, andas  
sedan ut långsamt.  
Skölj munnen  
efteråt.



Tryck ut 2 puffar i luften om det är första gången du använder inhalationssprayen eller om det gått minst 2 veckor sedan sist.

Om du ska ta fler inhalationer: Upprepa samtliga steg.

För mer information,  
läs bipacksedeln i  
förpackningen eller  
på [www.fass.se](http://www.fass.se)

Scanna QR-kod för instruktionsfilm på hur du använder AeroBec Spray



AeroBec®(beklametason). Inhalationsspray, lösning. Receptbelagt läkemedel.

**Användning:** AeroBec används vid astma. Den här typen av medicin används i förebyggande syfte och måste tas regelbundet, även när det inte finns några tecken på symtom. Full effekt förväntas först efter ca 10 dagars behandling.

**Varningar och försiktighet:** Tala med läkare eller sjuksköterska under tiden du använder AeroBec om du: • upplever att effekten av AeroBec försämras, t.ex. om du oftare får astmaattacker. Du kanske behöver ändra din läkemedelsbehandling • har svåra infektioner eller inför ett kirurgiskt ingrepp. Din läkare kan överväga tillägg av kortisonpiller till din vanliga behandling under påfrestande perioder • upplever dimsyn eller andra synrubbingar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. **Läs bipacksedeln noga.** AeroBec tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Maj 2022

**Teva Sweden AB**

Kungstorget 8 | Box 1070 | 251 10 Helsingborg  
Tel 042 12 11 00 | [www.teva.se](http://www.teva.se) | [info@teva.se](mailto:info@teva.se)

