



Patientinformation - Nyinsättning

Tacforius

(takrolimus)

Denna information lämnas ut av vårdgivare till dig som ordinerats behandling med Tacforius.

Tacforius är ett receptbelagt läkemedel som används för att hindra kroppen från att avstöta det transplanterade organet.

Patientinformation - Nyinsättning av Tacforius (takrolimus)

Denna information lämnas ut av vårdgivare till dig som ordinerats behandling med Tacforius. Tacforius är ett receptbelagt läkemedel som används för att hindra kroppen från att avstöta det transplanterade organet.

För fullständig information, läs bipacksedeln noggrant. Vid frågor, kontakta din läkare.

Introduktion

Din läkare har skrivit ut Tacforius som innehåller den aktiva substansen takrolimus. Det är ett immunsuppressivt läkemedel. Efter en organtransplantation (lever, njure) försöker kroppens immunförsvar att stöta bort det nya organet. Tacforius används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp, för att den ska acceptera det transplanterade organet. Du kan också få Tacforius mot en pågående avstötningsreaktion mot din transplanterade lever, njure, ditt hjärta eller annat organ, när annan behandling som du fått inte kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation. Tacforius används till vuxna.

Så använder du Tacforius

Tacforius skall tas enligt din läkares anvisningar. Tacforius tas via munnen en gång dagligen på morgonen. Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten. Dosen är beroende av ditt allmäntillstånd och på vilket/vilka andra immunsuppressiva läkemedel som du får. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många kapslar som du ska ta.

Om du har tagit för stor mängd av Tacforius

Om du av misstag har tagit för många kapslar, kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart.

Om du har glömt att ta ditt läkemedel

Om du har glömt att ta dina Tacforius-kapslar på morgonen, ta dem så snart som möjligt samma dag. Ta inte dubbel dos nästa morgon.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Tacforius försvagar kroppens försvarsmekanismer (immunförsvaret), vilket gör att kroppens förmåga att bekämpa infektioner blir sämre. När du tar Tacforius kan du därför få fler infektioner än vanligt. Vid nytillkomna symptom och/eller uttalade besvär kontakta läkare omedelbart.

Tacforius
takrolimus

Solen


Du bör begränsa exponeringen för sol- och UV-ljus (ultraviolett ljus) medan du tar Tacforius. Använd lämplig skyddande klädsel och solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Takrolimus utsöndras i bröstmjolk. Därför ska du inte amma medan du tar Tacforius.

Så här förvarar du Tacforius

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Inga särskilda temperatur-anvisningar. Använd alla depotkapslarna inom ett år efter att aluminiumomslaget öppnats. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.





OBS! Läs noggrant hela bipacksedeln som medföljer förpackningen.

Tacforius (takrolimus) receptbelagt läkemedel, hård depotkapsel, styrkor 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg, förpackningstorlek 50 st.

Användning: Tacforius tillhör en grupp läkemedel som heter immunsuppressiva medel. Efter en organtransplantation (lever, njure) kommer din kropp immunförsvaret att försöka stöta bort det nya organet. Tacforius används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp så att den ska acceptera det transplanterade organet. Tacforius används ofta i kombination med andra läkemedel som också sätter ner immunförsvaret. Du kan också ges Tacforius mot en pågående avstöttningsreaktion mot din transplanterade lever, njure, ditt hjärta eller annat organ, när annan behandling som du fått inte kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation.

Takrolimus som finns i Tacforius kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna text. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. Tacforius används till vuxna.

Varningar och försiktighet: Använd inte Tacforius, om du är allergisk (överkänslig) mot takrolimus eller mot något av övriga innehållsämnen i Tacforius eller om du är allergisk (överkänslig) mot något antibiotikum som tillhör undergruppen makrolida antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin eller josamycin). Du bör begränsa exponeringen för sol- och UV-ljus.

Graviditet och amning: Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Tacforius utsöndras i bröstmjolk. Därför ska du inte amma medan du tar Tacforius.

Körförmåga: Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller sömning, eller har problem att se klart efter att du tagit Tacforius. Dessa effekter är vanligare om du även dricker alkohol.

teva

Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg
Tel: +46 (0)42-121 100, info@teva.se, www.teva.se